

Implantatgetragener Zahnersatz – festsitzend oder herausnehmbar?

| ZT Iris Burgard

Immer mehr Patienten überlegen sich, ob sie sich nicht Implantate setzen lassen wollen, um die Lücken in der Zahnreihe zu schließen. Dabei denkt der Patient natürlich darüber nach, wie komfortabel es ist, wenn der neue Zahnersatz fest in der Zahnreihe integriert ist. Aufgabe des Zahnarztes und des Labors ist es hier, dem Patienten klar zumachen, wie es um die Hygiene steht bzw. welche Gefahren lauern, wenn die Implantate nicht richtig gepflegt werden.

Bei kleineren Implantatarbeiten ist es in der Regel selbstverständlich, dass der darauf gefertigte Zahnersatz festsitzend integriert wird. Hier geht es ja auch oft „nur“ darum, dass gesunde Nachbarzähne nicht als Pfeiler für eine Brücke beschliffen werden müssen. Wenn es einzelne Implantate sind, die nur für einzelne Zähne stehen sollen, ist die Hygiene normalerweise auch kein Problem: Zahnbürste und Zahnseide langen bei regelmäßiger Anwendung auch, um eigene Zähne, Implantate und Zahnfleisch gescheit sauber zu halten.


Festsitzend ...

Schon wenn mehrere Implantate im Mund sind, wird das schwieriger. Sicherlich wird es von dem Patienten als komfortabel angesehen, wenn eine Lücke geschlossen werden kann und er dabei auch keine Ge-



Situation für eine komplette Sanierung.

fahr läuft, dass sich der Zahnersatz einmal „selbstständig macht“. Kleine Implantatbrücken sind sicherlich in ihrem Pflegeaufwand ähnlich wie eine Brücke, die auf richtigen Zähnen verankert ist. Hier kommt es aber auch darauf an, welche Philosophie der Zahnarzt für eine Implantatversorgung verfolgt. Oft wird die Implantatbrücke fest zementiert, sodass sie (fast) unwiederbringlich auf ihren Pfeilern fixiert ist. Der Patient sollte sich also die Zähne regelmäßig mit einer Mund-
d u s c h e
p f l e g e n
u n d d i e



Eine komplette Implantatbrücke im Oberkiefer.

Prophylaxetermine bei seinem Zahnarzt wahrnehmen, damit er den Komfort länger genießen kann. Andere Zahnärzte verfolgen die Philosophie, dass der implantatgetragene Zahnersatz wenigstens einmal im Jahr komplett kontrolliert werden sollte. Die Verankerung der einzelnen Pfeiler im Kiefer kann vom Zahnarzt kontrolliert und gereinigt werden, wenn er die Brücke mit Schrauben fixiert hat. So kann der Zahnarzt auch kontrollieren, ob das Implantat noch fest im Kieferknochen verankert ist oder ob ein Entzündungsherd im Implantatbereich zu erkennen ist – schließlich ist das Implantat immer ein Fremdkörper im Mund.

... oder doch besser herausnehmbar?

Implantate werden außerdem als Pfeiler für herausnehmbaren Zahnersatz verwendet. Hier gilt natürlich, ähnlich wie bei den eigenen