


# Behandlungsausgaben im Praxisalltag

In einer prozentualen Aufschlüsselung der Ausgaben für zahnmedizinische Behandlungen zeigt sich: Den größten Ausgabenbereich nehmen mit 53,5 Prozent konservierende und chirurgische Behandlungen (ausgenommen Individualprophylaxe) ein, an zweiter Stelle kommen Zahnersatzversorgungen mit 23,1 Prozent. Den kleinsten Ausgabenbereich stellt die Individualprophylaxe mit 4,1 Prozent dar. Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2022 und ein Gesamtausgabenbudget von **16.746 Millionen Euro**.

Quelle: © Daten & Fakten 2024 – BZÄK und KZBV




- **7,7%** Kieferorthopädie  
1.293 Mio. Euro
- **4,1%** Individualprophylaxe  
640 Mio. Euro
- **4,4%** Sonstiges (Kieferbruch/Kiefergelenk)  
742 Mio. Euro
- **7,2%** Parodontalbehandlung  
1.206 Mio. Euro

© benjaminolte – stock.adobe.com



## Zuzahlung bei Medikamenten

## Frisch vom Metzger



Rezeptpflichtige Medikamente aus der Apotheke sind in der Regel zuzahlungspflichtig. Ist das Medikament nicht in der gewünschten Packungsgröße vorrätig und werden stattdessen mehrere kleinere Packungen ausgegeben, ist das seit dem 1. Februar 2024 preiswerter: Wer zum Beispiel statt einer 100-Stück-Packung zwei 50-Stück-Packungen erhält, für den wird die Zuzahlung nur einmal fällig statt bisher zweimal.

Quelle: [www.bundesregierung.de](http://www.bundesregierung.de)



# PLAQUE KONTROLLE VON ALLEN SEITEN

**STUDIEN ZU LISTERINE® ZEIGEN:**

## 4,6x HÖHERE INTERPROXIMALE PLAQUE-PRÄVENTION versus Zahnseide\*<sup>1</sup>



**28 % mehr interproximale Plaque-Reduktion**

bei Ergänzung von LISTERINE® versus Zähneputzen + Anwendung von Zahnseide\*\*<sup>2</sup>



**LISTERINE® bekämpft 99.9 % der Bakterien**

reduziert den oralen Biofilm und verlangsamt die bakterielle Wiederbesiedelung<sup>3-6</sup>



Mehr zu den Studien  
und zur Wirkweise von LISTERINE®

\* Anhaltende Plaque-Prävention über dem Zahnfleischrand bei kontinuierlicher, zweimal täglicher Anwendung über 12 Wochen nach professioneller Zahnreinigung. Die Anwendung von Zahnseide wurde von einem bzw. einer Dentalhygieniker:in durchgeführt.

\*\* Anhaltende Plaque-Reduzierung über dem Zahnfleischrand bei Anwendung nach Anweisung für 12 Wochen nach professioneller Zahnreinigung. Die Anwendung von Zahnseide wurde unter Aufsicht durchgeführt. Verwenden Sie LISTERINE® in Ergänzung zur mechanischen Reinigung (3-fach Prophylaxe). **1** Bosma ML et al; J Dent Hyg, June 2022, Vol. 96, No. 3, 8-20. **2** Millemann J et al.; J Dent Hyg, June 2022, Vol. 96, No. 3, 21-34. **3** Johnson & Johnson internal in vitro study: 103-0391. Johnson & Johnson 2021. **4** Johnson & Johnson internal study: FCLGBP0048. Johnson & Johnson 2021. **5** Johnson & Johnson internal study: CCSORCO01793 (Serenity). Johnson & Johnson 2020. **6** Stoeken JE et al.; J Periodontol. 2007; 78 (7): 1218-1228.

**Empfehlen Sie LISTERINE® als Teil der 3-fach-Prophylaxe für überlegene Ergebnisse**

