

Brust- korrektur

Die Brustvergrößerung (Brustaugmentation) ist eine Operation, die meist aus ästhetischen Beweggründen vorgenommen wird. Mithilfe von Implantaten aus Silikon kann dem Brusthügel eine harmonische Form gegeben werden. Es kann sich bei einer Brustvergrößerung allerdings auch um eine medizinisch indizierte Operation handeln. Nämlich unter anderem dann, wenn eine entstellende Fehlbildung der weiblichen Brust vorliegt. Dies ist beim Polandsyndrom, der tubulären Brustdeformität oder beim Amazonensyndrom der Fall. Liegen derartige Missbildungen vor, handelt es sich um eine Erkrankung im Sinne des Sozialgesetzbuches.



Brustvergrößerung (mit Implantaten)

Operation

Bei der Brustvergrößerung kann das Implantat über verschiedene Wege in den Körper eingebracht werden. Möglich sind z. B. Schnitte in der Achsel, am Rand des Brustwarzenhofs oder unterhalb der Brust, die je nach dem anatomischen Verhältnis der Patientin vorgenommen werden können. Der kleine Schnitt in der Brustumschlagfalte (4–6 cm) ermöglicht das schnelle und risikoarme Platzieren des Implantates und wird deshalb oft bevorzugt.

Auf Wunsch kann selbstverständlich das Implantat auch über die Achsel oder einen Brustwarzenrandschnitt eingesetzt werden. Das Implantat wird entweder unter das Drüsengewebe und oberhalb des Brustmuskels oder aber unterhalb des Brustmuskels eingebracht. Um spätere Komplikationen möglichst zu vermeiden, sind eine peinlich genaue Blutstillung und eine Spülung der Implantattasche mit einem Antiseptikum anzuraten. Eine Saugdrainage leitet Wundsekret ab. Die Wunde wird sorgfältig verschlossen und durch einen elastischen Verband gestützt.


Nach der Operation

| Entfernung des Verbandes nach 7 Tagen

| Nach 8 Tagen (falls notwendig) Fädenentfernung

**| 4 Wochen Sport-BH tragen,
danach ist Sport wieder möglich**

Nach der Operation bekommt die Patientin einen festen Tape-Verband und wird für 24 Stunden, d.h. eine Nacht stationär überwacht. Am ersten Tag nach der Operation wird der Verband kontrolliert und, falls keine Störungen vorliegen, kann sich die Patientin nach Hause fahren lassen. Den Verband nimmt der Arzt meist nach einer Woche ab. In den ersten 4 Wochen sollten ausladende Armbewegungen möglichst unterbleiben, um ein ungestörtes Einheilen des Implantats zu gewährleisten.



Mögliche Komplikationen

Wie bei jeder Operation kann es auch bei der Brustvergrößerung mit Implantaten prinzipiell zu Infektionen, Blutergüssen, Sensibilitätsstörungen, Wundheilungsstörungen (hier sind besonders Raucher betroffen), Thrombosen und möglicherweise daraus resultierende Lungenembolien (besonders bei langen Operationen und stark übergewichtigen Patienten) und natürlich Narbenbildung kommen. Stillen ist grundsätzlich auch mit einem Brustimplantat möglich.

In seltenen Fällen kann die Sensibilität der Brustwarze dauerhaft reduziert sein. Eine weitere mögliche Komplikation ist die Kapselfibrose.

Um jeden implantierten Fremdkörper bildet der Körper eine Kapsel, die in der Regel dünn und geschmeidig ist. Verdickt und verhärtet sich die Bindegewebshülle, kann es zu Schmerzen und unschönen Brustdeformationen kommen.

Diese Kapsel sollte nur operativ gespalten oder entfernt werden. Dabei ist der Austausch des Implantats vorgeschrieben. Diese Komplikation kann bald nach dem Eingriff oder auch erst viele Jahre später auftreten.

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Kapsel-fibrose ist heute mit modernen, texturierten Implantaten deutlich geringer als noch vor zehn Jahren.

setzen zu können. Ein weiterer, senkrechter Schnitt vom unteren Warzenhof durch die untere Hälfte des Busens ist oft sinnvoll, um der Straffung Halt zu verleihen.

Ein querer Schnitt in der Unterbrustfalte ist erforderlich, wenn viel überschüssige Haut zu entfernen ist. So erhält man eine schöne Brustform, muss jedoch ziemlich ausgedehnte Narben in Kauf nehmen. Manche Operateure verzichten auf den unteren Schnitt in der Hautumschlagfalte und setzen dadurch geringere Narben. Bei ausgefeilter Nahttechnik sind die zu erwartenden Narben oft wenig auffällig.

Nach der Operation

I Drainagen werden nach 24 Stunden gezogen

I Nach 8–10 Tagen erneuter Verbandwechsel

I 12 Wochen Tragen eines Sport-BHs

I Nach 12 Monaten Abschlusskontrolle

Nach der Operation bleibt die Patientin für 1–2 Nächte in stationärer Behandlung. Die Wunddrainagen werden, sofern erforderlich, nach 24 Stunden gezogen. Nach 8–10 Tagen wird der Verband gewechselt. Fäden müssen nicht entfernt werden, wenn selbstauflösendes Nahtmaterial verwendet wurde. Die Patientin trägt dann für 12 Wochen noch einen Sport-BH. Nach 12 Monaten wird die Abschlusskontrolle durchgeführt. Bei störenden Narben können diese durch verschiedene meist nicht operative Maßnahmen verbessert werden. In den ersten Wochen erscheint die Brust überkorrigiert, was jedoch gewünscht und von vorübergehender Dauer ist.


Bruststraffung

Mit einer Bruststraffung kann die nach einer Schwangerschaft oder im Zuge des Alterungsprozesses erschlaffte Brust neu geformt werden. Wenn genügend Gewebe vorhanden ist, kann dies ohne die Implantation eines Brustimplantats erfolgen. Ist es jedoch zu einem Schwund des Fett- und Drüsengewebes gekommen, so kann mit einem Brustimplantat und gleichzeitiger Bruststraffung eine harmonischere Erscheinungsform der Brust erreicht werden.

Operation

Oft wird auch eine Bruststraffungsoperation mit einem Implantat verbunden, wenn die Patientin neben einer Straffung auch eine Vergrößerung der Brust wünscht. Meist sind jedoch bei Straffungsoperationen die Brüste groß und schlaff, sodass die Patientin eine Verkleinerung bzw. Reduktion der Brust und eine Straffung und Hebung der Brustwarzen wünscht.

Für die Bruststraffung stehen verschiedene Schnitttechniken zur Verfügung. Welches Verfahren dabei zum Einsatz kommt, hängt vom individuellen Befund der Patientin ab. Grundsätzlich wird das Verfahren mit den kleinsten Narben bei bester Verbesserungsmöglichkeit gewählt. Dabei erfolgt immer ein Schnitt um den Warzenhof, um die Brustwarze nach oben ver-



Mögliche Komplikationen

Spezielle Risiken einer Bruststraffung ergeben sich aus einem möglichen Verlust der Stillfähigkeit. Wie bei jeder Operation kann es auch bei der Bruststraffung prinzipiell zu Infektionen, Blutergüssen, Sensibilitätsstörungen, Wundheilungsstörungen (hier sind besonders Raucher betroffen), Thrombosen und möglicherweise daraus resultierende Lungenembolien (besonders bei langen Operationen und stark übergewichtigen Patienten) und natürlich Narbenbildung kommen.

White Is Beautiful

Privatpraxis Dr. Stephan Hinz – Salzburg



Dr. med. Stephan Hinz

Zahnarzt

Vita

Studium

1994–2000 Charité Berlin
2003 UCLA, Los Angeles

Fort-/Weiterbildung

Implantologie, Parodontologie,
Ästhetische Zahnheilkunde,
Kieferorthopädie

Beruflicher Werdegang

2000–2002 Assistenzzeit im
Schwarzwald
2002 Privatpraxis am Bodensee
2003–2005 Privatklinik
Norddeutschland
Seit 2006 Privatpraxis Salzburg

Spezialisierung

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
der DGI, Tätigkeitsschwerpunkt
ästhetische Zahnheilkunde der DGÄZ

Leistungsspektrum

- Ästhetische Zahnheilkunde
- Ganzheitliche Sanierungskonzepte
- 3-D-navigierte Implantologie
 - Parodontologie, Knochenaufbau
 - Unsichtbare Zahnregulierung
 - Eigenes Meisterlabor
 - Vollnarkosebehandlungen



Die White Is Beautiful Zahnarztpraxis hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem Magnet für Ästhetische Zahnheilkunde entwickelt. Dr. Stephan Hinz hat ein außergewöhnliches Behandlungskonzept für anspruchsvolle Kunden und Angstpatienten in Salzburg entwickelt. Höchste fachliche Qualifikation, lang-

jährige Erfahrung und modernste Behandlungsmethoden ermöglichen ein umfangreiches Behandlungsspektrum. Die Kooperation von perfekter zahn technischer Dienstleistung und zahnmedizinischer Hightech-Behandlung machen Salzburg zu einem Anziehungspunkt für Patienten aus Bayern und Österreich.

Wohlfühlatmosphäre und individuelle Betreuung

Kein überfülltes Wartezimmer, kein Zahnarztgeruch – in der White Is Beautiful Praxis können Sie sich in moderner und ruhiger Atmosphäre entspannen, für jeden Patienten wird eine individuelle und speziell auf die Wünsche des Kunden abgestimmte Lösung gefunden. Von kleinen ästhetischen Korrekturen und Zahnaufhellungen innerhalb einer Stunde bis hin zu Gesamt-sanierungen in Narkose können Ihre dentalen Wünsche erfüllt werden. Bei einem ersten Beratungsgespräch werden

Sie umfassend über den Zustand Ihrer Zähne aufgeklärt, die verschiedenen Behandlungsoptionen und Möglichkeiten werden besprochen und mit den individuellen Zielen auf einen Nenner gebracht.

Gerade im Bereich der Implantologie hat die Praxis ihren Schwerpunkt, Sofortimplantationen mit direktem Zahnersatz, 3-D-Röntgenanalyse und Knochenaufbaumaßnahmen gehören hier zum Leistungsspektrum.

Ästhetik und Servicequalität

Die Zahnästhetik steht bei White Is Beautiful an erster Stelle. Kunden wünschen sich heutzutage keine Kronen und Brücken mehr, sondern natürliche und ästhetische unauffällige Zähne. Dafür sorgt das eigene Meisterlabor, welches von Beginn der Behandlung mit dem Patienten die Wünsche bespricht und direkt umsetzen kann. Zum Service gehört aber nicht nur diese exklu-

sive Betreuung, sondern auch die Organisation von Terminen und Abstimmung von An- und Abreise. Kunden, die eine längere Anfahrt haben, können bei uns oder im nahe gelegenen Hotel übernachten, auf Wunsch holt Sie auch eine Limousine vom Flughafen oder Bahnhof ab. In der White Is Beautiful Praxis ist jeder Kunde ein herzlich willkommenes Gast!

kontakt

Dr. Stephan Hinz

Auerspergstr. 2
A-5020 Salzburg

Tel.: +43 66 44 48 98 41
Fax: +43 6 62 87 31 53

E-Mail: info@wib-zahnarzt.at
www.wib-zahnarzt.at

