

Komplexe Restauration unter ästhetischen und funktionellen Gesichtspunkten

Systematische Behandlung und Therapie der craniomandibulären Dysfunktion unter ästhetischen, funktionellen und minimalinvasiven Gesichtspunkten

Autor_Dr. Kianusch Yazdani

Abb. 16 Eine zufriedene und glückliche Patientin.



Abb. 16

Einleitung

Schöne Zähne sind der Wunsch vieler Menschen, wie seit Jahren Umfragen ergeben.

Bei komplexen Fällen ist eine intensive Kommunikation zwischen Patient und dem Team Zahnarzt/Zahntechniker gefragt, die Therapie muss neben der Ästhetik auch in der Biologie und Funktion eine gute Prognose besitzen.

Ziel einer jeden Behandlung ist es, am Anfang des Gespräches ein Gefühl zu vermitteln, dass man sich um den Patienten individuell bemüht und eine Vertrauensbasis schafft.

Nach Abschluss der Behandlung sollte ein zufriedener Patient entlassen werden, der diesen Therapieschritt immer wieder machen würde.

Mit den heutigen adhäsiven Techniken und Materialien wie Komposite und Keramiken lassen sich minimal- und noninvasiv hervorragende ästhetische und gleichzeitig langlebige restorative Behandlungsmöglichkeiten wie Bisskorrekturen, Stellungsanomalien erschließen.

Gleichzeitig leben wir heute in einer Stressgesellschaft, und man „beißt“ sich durch das Leben. Die Zähne zeigen häufig die Spuren des psychischen Stresses durch verstärkte Abrasionen besonders in der Frontpartie. Dieser Beißstress wird natürlich auch an die umliegenden Gewebe wie Kiefergelenk, Muskel, HWS etc. weitergegeben.

Die Frage stellt sich, mit welchen Symptomen die umliegenden Gewebe auf diesen Stress reagieren: Adaptation, Maladaptation oder Kompensation (versteckter Schmerz) bzw. Dekompensation (Schmerz).

Für uns als Zahnärzte stellt sich die Frage, diese Funktionsstörungen und -erkrankungen ätiologisch zu erkennen, einzuordnen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sollte man den Patienten als Ganzes und nicht nur auf die Zähne begrenzt behandeln. Die psychologische Komponente spielt speziell bei den funktionsgestörten Patienten eine wesentliche Rolle.

Die Grundsätze der Diagnostik sind in Stellungnahmen der DGZMK bzw. der DGFD beschrieben. Daraus ergeben sich unterschiedliche Therapiegrundsätze interdisziplinärer Art.

Dazu bedarfes ein Netzwerk mit ggf. einem auf CMD spezialisierten zahnärztlichen Kollegen, Physiotherapeuten, Osteopathen, Orthopäden, HNO-Fachärzte und ggf. Neurologen, Psychologen, Internisten, Rheumatologen und Heilpraktiker etc. Es ist im Vorfeld nicht immer vorhersehbar, ob ein sol-

cher Fall auch mit definitiver Prothetik zu lösen ist, da neben der Okklusion auch Statik, Orthopädie, Stress, genetische Disposition und Psyche als Faktoren zum Tragen kommen, wobei wir als Zahnärzte nur die Okklusion primär mittels Okklusionsschienen reversibel beeinflussen können.

Stellt sich die Schienentherapie als wirksam heraus, kommen weitere Therapieoptionen in Betracht.

Patienten mit einer CMD haben eine viel instabiler Okklusion als adaptierte Patienten, sodass auch die Eingliederung von definitivem Zahnersatz sowie grundsätzlich eine Veränderung schnell zu Problemen führen kann. Typische Symptome wie Kopfschmerzen, HWS-Beschwerden, Schwindel, Rückenbeschwerden und Kiefergelenkbeschwerden flammen auf.

Die Hauptaufgabe besteht für uns Zahnärzte darin, eine stabile Okklusion zu erreichen und auch während der Rehabilitation diese nicht zu gefährden.



Abb. 2




Abb. 3



Abb. 1a



Abb. 1b



Abb. 7




Abb. 8



Abb. 11



Abb. 12



Abb. 14




Abb. 15



Abb. 15a



Abb. 15b

Im Folgenden wird anhand eines Patientenfalles der Ablauf eines praxisnahen Therapiekonzeptes der CMD bis zur prothetischen Rehabilitation unter

ästhetischen minimalinvasiven Gesichtspunkten aufgezeigt.

Patientenfall

Die Patientin, 54 Jahre, stellte sich 2007 vor und berichtete, seit Jahren an Kopfschmerzen, Hals- und Nackenbeschwerden wie auch Rückenschmerzen zu leiden.

Durch eine von uns im Vorfeld behandelte Patientin erfuhr sie, dass diese Symptome etwas mit den Zähnen zu tun haben könnten.

Zusätzlich seien die Zähne empfindlich beim Kauen und bei Kälte/Wärme. Auch im Vorfeld behandelte Zähne mit Kompositfüllungen seien aufbiss- und temperaturempfindlich, zudem habe sie auch Zahnfleischbluten. Zusammenfassend wünschte sich die Patientin eine ästhetisch hochwertige und ganzheitliche funktionelle Lösung.

Diagnostik

Die Erstuntersuchung ergab nachfolgende Befundung:
Parodontitis TT 3–5 mm

Abb. 1a Ausgangssituation.

Abb. 1b Ausgangssituation nach Primärbehandlung.

Abb. 2 Situation OK nach Primärtherapie.

Abb. 3 Situation UK nach Primärtherapie.

Abb. 7 und 8 Wax-up.

Abb. 11 und 12 Probezahnersatz.

Abb. 14 Definitiver Zahnersatz OK.

Abb. 15a Zentrische Schlussposition.

Abb. 15b Definitiver Zahnersatz in Funktion.



Abb. 4 Diskrepanz zwischen IKP und Zentrik nach Schienentherapie.

Abb. 5 Diskrepanz zeigt eine Kompression und eine zu retrale Lage der Kiefergelenke.

Abb. 6 Wax-up.

- Multiple insuffiziente mehrflächige direkte Restaurierungen im Front- und Seitenzahnbereich
- Insuffiziente Krone Zahn 46 mit stark überstehenden Kronenrändern und chronischer Gingivitis mit Übergang in die Parodontitis
- Multiple Kariesläsionen
- Schliifffacetten an den Frontzähnen/Seitenzähnen
- Zahlreiche Rezessionen mit keilförmigen Defekten
- Wangenimpressionen
- Eingeschränkte positive und niedrige Lachlinie
- Klasse II-Verzahnung
- Unharmonische Inzisalebene
- Zahnfleischverlauf war nicht ideal, aber nicht störend
- Keine angemessenen Zahnproportionen, fehlende Dominanz der OK 1er
- Myotendopathie und Myogelosen der Elevatoren, Protraktoren und Nackenmuskulatur
- Koordinationsprobleme bei den Exkursionsbewegungen
- Eingeschränkte Mundöffnung mit Deviation nach links
- Anteroposition des Kopfes mit Tendenz nach links
- Atlas/Axis-Problematik (neuromuskuläre Verbindung zu Kiefergelenk)
- ISG-Problematik, Beckenschiefstand (Verbindung zum Os temporale) Meersseman-Test
- Gelenkkapsel bei Traktion und Translation auffällig beidseits (dorsolateral)
- Fortgeschrittene Discushypermobilität (partielle anterior-mediale Verlagerung) links stärker als rechts
- Bilaminäre Zone belastet links stärker als rechts (dorsokranial lateraler Belastungsvektor)

Primäre Behandlung

Primär ist es wichtig, dass ein gesundes Fundament für die weitere Therapie vorhanden ist.

Es erfolgte eine systematische Parodontaltherapie mit engmaschigem quartalsweisen Recall. Gleichzeitig erfolgte die Entfernung von Karies und der Austausch insuffizienter indirekter Restaurierungen durch Komposit. Die insuffiziente Krone 46 wurde durch ein Langzeitprovisorium ersetzt (Abb. 1-4).

Funktionelle Primärtherapie/ Schienentherapie/Wax-up

Neben der Karies- und Parodontistherapie erfolgte eine sechsmonatige erfolgreiche Schienentherapie mit begleitender Physiotherapie/Osteopathie/manueller Therapie (modifizierte Michiganschiene im Unterkiefer). Eine begleitende medikamentöse Maßnahme war nicht notwendig.

Nach drei Monaten Beschwerdefreiheit und Erreichen eines neuromuskulären stomatognathen Gleichgewichtes werden zwei möglichst identische Zentrikregisterate in minimaler Sperrung genommen. Zusätzlich erfolgt eine elektronische Axiographie zur Artikulatorprogrammierung (ARCUSigma, Fa. KaVo).

Die Abbildungen 4 und 5 zeigen eine große Diskrepanz vor (IKP) und nach Schienentherapie in zentrischer Kondylenposition. Die Situation nach Schienentherapie zeigt auf, dass vor der Behandlung eine Kompression der Kiefergelenke in retraler Lage vorlag. Das Ergebnis der Schienentherapie bestätigt die Diagnostik der manuellen Strukturanalyse.

Daraus ergaben sich therapeutische Ansatzpunkte durch Veränderung der statischen und dynamischen Okklusion.

Daraufhin wird ein diagnostisch-ästhetisch-funktionelles Full-Mouth-Wax-up/Mock-up mit diagnostischen Schablonen erstellt (Abb. 6-8).

Die nächste Frage beschäftigt sich damit, ob die angestrebte Restaurierung (Wax-up) mit der neuen Bisslage, welche wir mit der Schienentherapie uns erarbeitet haben, im Kausystem funktioniert.

Grundsätzlich werden und haben wir immer mit dem Problem der Übertragbarkeit vom Artikulator in einen Organismus mit beweglichen Schädelknochen und beweglichen Zähnen im Gegensatz zum starren Gipsmodell/Kausimulator zu kämpfen. Bei funktionsgestörten Patienten sind die Korrekturen der Bisslage nicht selten erheblich, sodass erst recht mit erhöhter Sensibilität gerechnet werden muss.

Die Exkursionsbewegungen und die Benettbewegung sind stark abhängig von der Aktivität der Kaumuskulatur.

Genau aus diesem Grunde „erproben“ wir unseren geplanten Zahnersatz grundsätzlich bei funktionsgestörten Patienten immer und können jederzeit eingreifen und nachjustieren, falls Probleme auftreten, ohne die Zahnsubstanz geschädigt zu haben.

Zusätzlich ist niemals nachzuvollziehen, ob der Patient die Schiene 24 Stunden mehrere Monate und

B R I T E V E N E E R S®

Smile Design – Ihr Einstieg in den Zukunftstrend non-prep Veneers

Zertifizierungskurs (9 Fortbildungspunkte)



vorher

10
Veneers in
1 Stunde

nachher

Erlernen Sie die **einfache Handhabung** des revolutionären BriteVeneers® non-prep Systems zum Wohle Ihrer Patienten und Ihrer Praxis

Vorteile für Ihre Patienten

- schmerzfrei – keine Spritze
- schonend – keine Entfernung gesunder Zahnsubstanz
- schnell – keine Provisorien
- strahlend – einfach schöne Zähne

In einer kleinen Arbeitsgruppe erleben Sie die Anwendung des BriteVeneers®-Systems bei der Komplettbehandlung durch den zahnärztlichen Trainer. Zudem erlernen Sie Schritt für Schritt das BriteVeneers®-System, indem Sie persönlich einen kompletten Veneerbogen (8 Veneers) im Rahmen einer praxisnahen Behandlung an Phantomköpfen selbstständig einsetzen.

Wählen Sie individuell nach dem Anspruch Ihrer Patienten das passende Veneersystem

BriteVeneers® Simulation Tray

einfache, schnelle
3D-Veneersimulation

BriteVeneers® One-Step ceramic

Zeitersparnis mit der zum
Patent angemeldeten Traytechnologie
100 % Keramik

BriteVeneers® handcrafted ceramic

individuelle Kreation mit maximalen
Transluzenz- und Farbvariationen
100 % Keramik

Kurse 2011

Düsseldorf

19.03.11 od. 14.05.11

Berlin

16.04.11 od. 25.06.11

Frankfurt

30.04.11

Rostock

28.05.11

München

04.06.11

Wien

17.09.11

Kurstdauer: 10.00–15.00 Uhr 1. Teil: Theoretische Einführung in das BriteVeneers®-System • 2. Teil: Demonstrationsbehandlung am Phantomkopf • 3. Teil: 15.00–18.00 Uhr Zertifizierung/Einsatz von 6–8 Veneers am Phantomkopf durch jeden Teilnehmer

MELDEN
SIE SICH
JETZT AN!

Tel.: +49-3 41/9 60 00 60 · Fax: +49-3 41/4 84 74 600 · E-Mail: info@brite-veneers.com · www.brite-veneers.com

Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfehlungen der KZBV einschließlich der Punktebewertungsempfehlung des Beirates Fortbildung der BZÄK und der DGZMK. **9 Fortbildungspunkte** (Teil 3)



Abb. 9



Abb. 10a



Abb. 10b



Abb. 13

Abb. 9 Eingliederung des Probezahnersatzes noninvasiv.

Abb. 10a Probezahnersatz noninvasiv.

Abb. 10b Lippenbild mit Probezahnersatz.

Abb.13 Definitiver Zahnersatz minimalinvasiv.

mehr trägt. Kauprozesse und die Sprachgebung sind überhaupt nicht nachvollziehbar.

Der beste Artikulator ist der Patient selbst. Die einzige Möglichkeit einer störungsfreien funktionellen und strukturellen Integration von Zahnersatz besteht in einer Probetragezeit mit einer festsitzenden „Schiene“, welche in Form und Funktion der angestrebten Zahnform entspricht und ästhetisch vom Patienten akzeptiert wird.

Zur Herstellung dieser festsitzenden Schiene bzw. des Probezahnersatzes ist das bereitgestellte ästhetisch-funktionelle Wax-up notwendig.

Teamapproach

Spätestens jetzt ist ein intensives Teamapproach mit dem Zahntechniker notwendig.

Grundsätzlich lernt bei uns jeder Patient das Team Zahnarzt/Zahntechniker persönlich kennen, sodass besonders der Zahntechniker, der letztlich den Zahnersatz anfertigt, sich auch ein Bild über die extraorale Ästhetik wie Mimik und Lachen machen kann.

Nur so können wichtige Parameter wie Gesichtsproportionen, Lippe, Mittellinie, Fontzahnänge, Position der Inzisalkante, die Lage der Okklusionsebene, die rote Ästhetik auch einbezogen werden in die Planung des Testzahnersatzes.

Fotos von den Zähnen wie auch ggf. ältere Fotos vom Patienten sind für eine intra- und extraorale Analyse und dem Wax-up- und Mock-up hilfreich.

Mithilfe des Mock-ups wird die Frontzahnänge mit dem Patienten bestimmt. Besonders bei den sogenannten „Funktionspatienten“ ist die Länge der Frontzähne häufig zu kurz. Der Patient hat sich aber über die Jahre mit den zu kurzen Zähnen identifiziert, deshalb bekommen viele einen Schreck und sind eher skeptisch mit dem ersten Entwurf des Mock-ups. Zusätzlich ist auch das notwendige vestibuläre Volumen der neuen Frontzähne zur Unterstützung der Lippen eher befremdlich. Abbildung 5 zeigt die große Diskrepanz der Länge der Frontzähne während der adhäsviven Befestigung.

Die Kommunikation des Teams Zahnarzt/Zahntechniker mit dem Patienten ist aus o.g. Gründen unabdingbar, um letztlich zu einem ästhetisch anspre-

chenden Ergebnis mit dem Patienten zu gelangen. Die Patienten sind für diesen Schritt dankbar, dass das geplante Behandlungsziel frühzeitig in puncto Mock-up und nachfolgender provisorischer Phase so deutlich vorgestellt wird.

Das Wax-up wie auch ähnliche Fälle werden mit der Patientin erläutert und gemeinsam ein Therapiekonzept mit non-/minimalinvasiven Seiten- und Frontzahnchips zur Erreichung einer zentrischen balancefreien Okklusion aus Komposit vorgestellt.

Dieses Konzept ist an eine enge Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker gebunden.

Die Patientin entschied sich für eine rein prothetische Lösung, obgleich eine kombiniert kieferorthopädisch-prothetische Lösung auch infrage gekommen wäre.

Behandlungsablauf für den „Test- oder Probezahnersatz“

Es besteht grundsätzlich kein einheitlicher Konsens darüber, wie lange der Patient mit diesem Probierzahnersatz zureckkommen muss. Eine Probephase von einem halben Jahr und Beschwerdefreiheit sollten wenigstens vorliegen.

Entscheidend ist, dass sich der Patient primär wohlfühlt, die statische und dynamische Okklusion stabil ist und kein Ansatz funktioneller Probleme im Kiefergelenk, der Gelenkkapsel, der Kaumuskulatur, der HWS, der Wirbelsäule und der Beckenproblematik zu erkennen ist.

Diese Full-Mouth-Restauration aus Hochleistungs-Polymer-Chips wurde in diesem Fall neun Monate in Funktion erfolgreich getestet. Die Form, Phonetik, Lippenstütze und die Kaufunktion entsprach den Wünschen der Patientin (Abb. 9–12).

Wir praktizieren diese Art von noninvasiven Zahnersatz bei funktionsgestörten Patienten seit mehreren Jahren und können, falls die Voraussetzung erfolgreiche Schienentherapie gegeben war, von ausschließlich positiven Feedbacks berichten.

Zwei Patienten tragen diesen noninvasiven Probezahnersatz schon mehrere Jahre, das zeigt, wie stabil diese Chips sind und deshalb auch bestens geeignet für funktionsgestörte Patienten sind.

Definitive Phase

Mit einer stabilen Abstützung können anschließend die Zähne Step by Step minimalinvasiv definitiv rekonstruiert werden, wobei immer auf eine eindeutige okklusale Abstützung zu achten ist. Die Gefahr der Kompression wird dadurch ausgeschlossen. In welcher Reihenfolge vorgegangen wird, wird kontrovers diskutiert, wir haben mit den Seitenzähnen angefangen und zum Schluss wurde die OK-Front definitiv etabliert. Wir haben umgekehrt auch viele Fälle rekonstruiert, wo die Frontzähne zuerst rekonstruiert

werden, sodass hier keine Präferenzen aufgezeigt werden sollen.

Die Kompositteilkronen dienen als perfekter Aufbau, sodass gerade bei diesem Fall okklusal wie auch vestibular und oral fast nur im Schmelz präpariert wurde. Ein Implantat Regio 36 wurde trotz intensivster Aufklärung nicht gewünscht, sodass leider die Nachbarzähne, welche aber schon größere Primärdefekte aufwiesen, für eine Zirkonbrücke präpariert wurden. Alle Keramikveneers und Teilkronen wurden aus IPS e.max Press der Firma Ivoclar Vivadent hergestellt. Diese Keramik aus Lithium-Disilikat zeichnet sich durch eine hervorragende Stabilität und Festigkeit (400 n/MPa) aus und bieten gleichzeitig eine hervorragende Ästhetik.

Alle Restaurationen – nach Anprobe gereinigt, geätzt mit Flusssäure (IPS Keramik Ätzgel) und silanisiert (Monobond Plus) – wurden unter Kofferdam mit einem Flowable-Komposit adhäsig befestigt. Mittel der Wahl ist ein Etch & Rinse-System, welches den Goldstandard darstellt (Syntac Classic, Firma Ivoclar Vivadent). Die Zirkonbrücke (ZirCad) 35–37 wurde abgestrahlt mit Aluminiumoxid und mit einem selbstätzenden System wie Multilink (Fa. Ivoclar Vivadent) befestigt (Abb. 11–15). Die Teilkronen an den Prämolaren wurden nach Absprache des Patienten aus substanzschützenden Gründen nur bis ungefähr zum Äquator präpariert.

Zusammenfassung

Im dargestellten komplexen Patientenfall ist die Sanierung ohne gravierende Probleme durchgeführt worden, was nur durch das konsequente Einhalten des Konzeptes und der engen Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker und auch der guten Compliance der Patientin zu verdanken ist.

Große Einschleifprozeduren gehören mit diesem Konzept praktisch der Vergangenheit an. Ein Einschleifen der definitiven Keramikrestaurationen sollte nach dem Glanzbrand grundsätzlich vermieden werden, um eine Schwächung der Oberfläche zu vermeiden.

Die Behandlungen/Präparationen sind für den Patienten entgegen früherer Methoden (innerhalb von zwei Tagen Präparation beider Kiefer) viel weniger intensiv, gerade funktionsgestörte Patienten haben Schwierigkeiten mit längeren Sitzungen, auch der Behandler sieht mit dieser Methode solchen Fällen viel gelassener entgegen, da jeder Schritt planbar ist und auch die Abformungen viel einfacher sind.

Das Gesamtergebnis ist für den Patienten rundum gelungen. Die Möglichkeit der Vorhersagbarkeit durch Kontrolle und möglicher Veränderung des Zahnersatzes (Form, Farbe, Funktion) trug nicht unwesentlich dazu bei.

Nichtsdestotrotz sollten verschiedene Therapieoptionen und Behandlungsmodalitäten in solchen



Abb. 17



Abb. 18a



Abb. 18b

Abb. 17 Die Patientin kann mit dem funktionierenden Zahnersatz wieder richtig zubeißen.

Abb. 18 Ein harmonisches Lächeln.

Autor cosmetic dentistry



Dr. Kianusch Yazdani

Examen 1995 in Münster, seit 2006 niedergelassen in Münster/Westfalen. Mitglied in Studiengruppe für restorative Zahnheilkunde, aktives Mitglied der DGEndo, DGFDT, DGÄZ, AGET.

Regelmäßige Referententätigkeit und Publikationen im In- und Ausland über die Tätigkeitsschwerpunkte: mikroskopische Endodontie, ästhetische Zahnheilkunde, Funktionstherapie und Funktionsdiagnostik, komplexe minimalinvasive Rehabilitationen

Kontakt:

Dr. Kianusch Yazdani
Neubrückenstr. 12–14
48143 Münster
Tel.: 02 51/4 61 80