


Minimalinvasive ästhetisch-funktionelle Versorgung bei Nichtanlagen und hypoplastischen (Milch-)Zähnen

Immer häufiger kommen Patienten mit multiplen Nichtanlagen oder dysmorphen Zähnen mit dem Wunsch nach einer ästhetisch ansprechenden, aber minimalinvasiven und gleichermaßen möglichst schnellen und schmerzfreien Behandlung in die Praxis. Besonders bei nicht angelegten Zähnen im sichtbaren Frontzahn-bereich stehen betroffene Patienten oftmals unter hohem Leidensdruck und suchen nach Alternativen zu invasiven Implantatoperationen. Der folgende Fachbeitrag stellt eine minimalinvasive Versorgung bei multiplen Nichtanlagen und persistierenden Milchzähnen dar.

ZÄ Lara Sommer, Dr. Marcus Striegel, ZTM Martin Toennies



Die 24-jährige Neupatientin stellte sich mit dem Wunsch nach „schönen Zähnen und einem tollen Lächeln“ vor. Die Befunde ergaben ein klinisch und röntgenologisch gesundes Gebiss, allerdings mit multiplen Nichtanlagen und persistierenden Milchzähnen. Die Zähne 14, 15, 12, 22, 25 sowie die Weisheitszähne waren bei der Patientin nicht angelegt. Die Patientin wollte ihre Milchzähne so lange wie möglich erhalten. Zahn 13 ist in der Position des ersten Prämolaren durchgebrochen, die Milchzähne 55, 53, 52 und 65 sind persistierend. Die Lücke Regio 22 ist durch eine einflügelige, am Zahn 23 palatinal verklebte Komposit-Anhängerbrücke provisorisch versorgt. In der Unterkieferfront ist nach erfolgter und abgeschlossener kieferorthopädischer Behandlung in der Jugend ein Retainer geklebt. Konservierend sind die Zähne 55 und 65 durch Kompositfüllungen versorgt (Abb. 1). Die Vitalitätsprobe mit CO₂-Schnee fiel bei allen vorhandenen Zähnen positiv aus.



01
OPG präprothetisch.

02a
Vergrößerte Ansicht: Die Patientin hat Lücken in der Front, persistierende Zähne 52 und 53 und eine Nichtanlage von Zahn 22 mit Interimsversorgung durch eine Anhängerbrücke aus Komposit. Die orangenen Pfeile deuten auf die Zahnhalsdefekte.

Auffallend waren die ausgeprägten zervikalen Defekte, besonders an den Zähnen 55 und 65, als auch weniger stark ausgeprägt an 53 und 52. Die ersten Molaren waren beiderseits neutralverzahnt, im Eckzahnbereich lag eine halbe Prämo-



02b
Ausgangssitu-
ation in frontaler
Ansicht lächelnd.

03
Protrusionsbewe-
gung präprothe-
tisch, exzentri-
scher Kontakt auf
Zahn 55.



03

larenbreite Distalverzahnung vor. Der Overjet war mit 3 mm leicht erhöht, der Overbite lag im Normbereich. Zudem stellte sich ein offener Biss Regio 53/43 dar. Das parodontale Screening ergab lediglich eine leicht erhöhte Blutungsneigung des Zahnfleisches aufgrund von Zahnstein. Funktionell ergab sich nach einem CMD-Kurzscreening nach Ahlers und Jakstat¹ zunächst kein Behandlungsbedarf. Bei Betrachtung der dynamischen Bewegungen fiel die initiale laterotrusive Gruppenführung bei Laterotrusionsbewegung nach rechts auf. Im Hinblick auf die teilweise übermäßigen und nicht altersgerechten zervikalen Substanzverluste (besonders an den steil stehenden Milchmolaren 55 und 65) sowie der fehlenden Front-Eckzahn-Führung rechts bei Laterotrusions- als auch bei Protrusionsbewegungen kann von einer Dysfunktion aufgrund von exzentrischen Zahnkontakten (Abb. 2) ausgegangen werden, was der Versorgung der Frontzähne neben der ästhetischen auch eine funktionelle Indikation beimisst.^{2,3} Ästhetisch störte sich die Patientin massiv an ihrem dysharmonischen Lächeln. Sie beschrieb ihre Frontzähne als zu klein und lückig (Abb. 2a und b).

Vorgehen

Bereits beim Ersttermin wurde die Ausgangssituation digitalisiert: Es wurde ein Scan von Ober- und Unterkiefer sowie des habituellen Bisses gemacht. Per Digital Smile Design konnten virtuell die ideale Zahnlänge und -form modelliert werden. Anschließend wurden durch 3D-Druckverfahren Situationsmodelle hergestellt, auf denen ein Wax-up der Zähne 14–24 nach virtuellem Vorbild erstellt werden konnte.



04
Mock-up/
Provisorium
frontal.

05a
Silikonschlüssel
auf dem Modell.

05b
Indirekte
Kompositfüllung
mithilfe eines
Silikonschlüssels.




05a




05b

06a



06a
Präparation
(digitalisiertes
Gipsmodell).

06b



06b
Design der
Wachskäppchen mit
Verblendenfenster.

Noch tiefer einsteigen?



Hier gibt's mehr
Bilder.



„Durch die digitale Planung und das direkte Mock-up am Patienten kann dieser leicht in die Behandlungsplanung integriert und zur Behandlung motiviert werden.“

07a+b
Endergebnis mit
eingesetzten
Teilkronen 53, 52,
11, 21, Anhänger-
brücke an Zahn
23 mit Anhänger
an 22 in Frontal-
ansicht (lächelnd).



07a

08a
Ausgangs-
situation.

08b
Protrusions-
bewegung mit
eingesetztem
Zahnersatz.



07b

Beim darauffolgenden Beratungstermin konnte mittels eines laborgefertigten Silikonschlüssels und Tetric Evo Flow Bleach L (Ivoclar) ein direktes Mock-up zur Veranschaulichung für den Patienten erstellt werden (Abb. 4).

Das temporäre Ergebnis überzeugte die Patientin. Es wurde eine vollkeramische Versorgung der Front (Zahn 53–23) sowie Kompositfüllungen und Aufbauten der Zähne 55, 13, 24, 65 geplant. Es fand eine professionelle Zahnreinigung mit Pulverstrahlanwendung (AIRFLOW, EMS) zur Eliminierung jeglicher extrinsischer Verfärbungen und Auflagerung sowie ein präprothetisches Bleaching mit FLÄSH



08a



08b

Fazit für die Praxis

statt. Anschließend erfolgte die Farbnahme durch den Techniker (Farbe: B1). Zunächst wurden Zahnhalsfüllungen an Zahn 55 und 65 sowie indirekte Kompositaufbauten der Zähne 13 und 24 mit Tetric Evo Flow A1 nach Vorbild des Wax-ups mithilfe des Silikonschlüssels gemacht (Abb. 5a und b). Die Präparation der Frontzähne erfolgte so minimalinvasiv wie möglich innerhalb der Schmelzschicht weitgehend ohne Freilegung von Dentin, um vor allem für die Milchzähne eine langzeitstabilere Schmelzklebung zu erreichen.

Die Präzisionsabformung erfolgte digital (3Shape) sowie analog mittels Doppel-mischtechnik mit Impregum und Permadyne (beide 3M ESPE) und eines zuvor angefertigten individuellen Abformlöffels. Zusätzlich wurde ein Gesichtsbogen- sowie ein habituelles Bissregistrator mit Omnibite genommen. Das Provisorium wurde erneut mithilfe des Silikonschlüssels und Luxatemp Farbe A1 hergestellt, von Hand ausgearbeitet und mit einem dualhärtenden provisorischen Befestigungskomposit (Teliolink) provisorisch eingesetzt (s. Abb. 4). Nach Modellherstellung wurden mittels CAD/CAM-Technik Wachs-käppchen hergestellt und durch ein Press-verfahren in einer Lithiumdisilikatkeramik (e.max) gepresst (Abb. 6a und b).

Veredelt wurde die labiale Fläche jeweils durch die individuelle Schichtung mit einer Verblendkeramik (IPS e.max Ceram, Ivoclar). Die definitive Versorgung wurde mittels Adhäsivtechnik mit Tetric Flow Bleach L eingegliedert. Mit dem Endergebnis ist die Patientin sehr zufrieden (Abb. 7a und b). Funktionell konnten durch die neue Front-Eckzahn-Führung exzentrische Störkon-takte bei der Protrusionsbewegung sowie in der Laterotrusionsbewegung eliminiert werden (Abb. 8). Die Führung bei Latero-trusion nach rechts erfolgt zur Schonung des Milchzahnes 53 (verkürzte Wurzel, siehe Abb. 1) auch weiterhin initial mit über den Zahn 14.

Welche Probleme bzw. Einschränkungen sind bei der definitiven Versorgung von Milchzähnen zu erwarten und was muss der Patient wissen?



ZÄ Lara Sommer: Milchzähne sind kleiner, haben kürzere Wurzeln und unterscheiden sich auch mikromorphologisch (Schmelz- und Dentinstruktur) von bleibenden Zähnen.⁴ Das Risiko für frühzeitigen Verlust ist somit höher und der langfristige adhäsive Verbund zur Keramik leicht herabgesetzt. Der

Verbund kann maximiert werden indem nur minimalinvasiv in der Schmelzschicht präpariert wird. Funktionell muss darauf geachtet werden, dass keine Überlastung stattfindet und beispielsweise wie im vorliegenden Fall der erste Prämolare in die Laterotrusion miteinbezogen wird. Der Patient muss darüber Bescheid wissen, dass die Langzeitprognose für Milchzähne im bleibenden Gebiss im Vergleich zu den permanenten Zähnen trotz Allem herabgesetzt ist.

Welche Alternativbehandlungen müssen daher besprochen werden?



Dr. Marcus Striegel: Die Versorgung der Milchzähne mit Keramiken oder auch Kunststoffen sind Kompromissbehandlung. Die Alternativen sind wesentlich invasiver oder möglicherweise mit ästhetischen Einbußen verbunden. So wären die Exzision der Milchzähne mit nachfolgender Implantation oder die Versorgung mit einer konventionellen Brückenkonstruktion zwei weitere Möglichkeiten. In manchen Fällen

kommt auch ein kieferorthopädischer Lückenschluss infrage.

Was sind die Vorteile von DigiLog im vorliegenden Fall? Warum führt das Zusammenspiel von digitaler Technik/Planungssoftware und handwerklicher Meisterleistung zum Erfolg?



ZTM Martin Toennies: Durch die digitale Planung und das direkte Mock-up am Patienten kann dieser leicht in die Behandlungsplanung integriert und zur Behandlung motiviert werden.^{5,6} Die Kommunikation zwischen Behandler, Patient und Techniker ist ein-

facher.⁷ Die Abformung kann bei epi- oder supragingivalen

Präparationen wie im vorliegenden Fall meist gut digital sowie analog erfolgen, bei subgingivalen Präparationsgrenzen ist der analoge Weg oftmals noch der zuverlässigere und genauere. Durch Planungssoftwares kann unter anderem der nötige Substanzabtrag oder notwendige Schichtstärken überprüft und ermittelt werden.⁸ Trotzdem sollte sowohl die Farbnahme bei hochästhetischen Fällen als auch die Individualisierung der gepressten oder geformten Keramiken durch den Techniker erfolgen.

ZÄ Lara Sommer

Dr. Marcus Striegel

ZTM Martin Toennies

edel&weiss

Dres. Schwenk, Striegel,

Göttfert & Kollegen

Ludwigsplatz 1a

90403 Nürnberg

sommer@edelweiss-praxis.de

Infos zur Autorin
ZÄ Lara Sommer



Infos zum Autor
Dr. Marcus Striegel



Infos zum Autor
ZTM Martin Toennies



Literatur

